

Type de réponse immunitaire adaptative		RIMH (à médiation humorale)	RIMC (à médiation cellulaire)
Cellules immunitaires impliquées		Lymphocytes B	Lymphocytes T (LT CD4, LT CD8)
Cible (type d'agent infectieux)		Bactéries, virus, parasites, toxines...	Cellules portant des marqueurs du non soi : cellules infectées, cancéreuses ou étrangères (provenant d'une greffe)
Récepteurs membranaires aux Ag		Ac (Ig)	Récepteur T (CD4 et CD8)
Phases de la réponse immunitaire adaptative	1) Sélection clonale <i>(reconnaissance de l'antigène)</i>	Activation du LB par la présentation par une CPA d'un Ag associé au CMH, ou directement par la fixation d'un Ag sur le récepteur	Activation du LT par la présentation par une CPA d'un Ag associé au CMH
	2) Amplification clonale <i>(formation d'un clone par mitoses)</i>	Formation d'un clone à partir du (ou des) LB activé(s)	Formation d'un clone à partir du (ou des) LT activé(s)
	3) Différenciation des lymphocytes en cellules effectrices	Différenciation des LB en plasmocytes et en LB mémoires	Différenciation des LT CD4 en LTh auxiliaires), des LT CD8 en LTc cytotoxiques ; des deux types en LT mémoires (CD4 et CD8)
	4) Phase effectrice	- Neutralisation des Ag « masqués » par les Ac circulants - Facilitation de la phagocytose Pas de contact direct entre le LB et l'agent infectieux	- Stimulation de l'amplification clonale par l'IL 2 (sécrétée par les LTh) - Lyse cellulaire (perforine et granzyme) - Activation de l'apoptose Contact direct entre le LT et l'agent infectieux